

Il materiale viene fornito sotto forma di polvere e polvere che devono essere sempre utilizzati insieme dalodontofora professionista (odontotecnico).

Caratteristiche del materiale	Specifiche	Metodo
Assorbimento	< 40 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Solubilità	< 7,5 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Resistenza alla flessione	> 50 MPa	EN ISO 10477

Varianti: Disponibile in diversi colori e quantità. Consultare il proprio distributore.
Indicazioni: denti danneggiati; edentulia parziale.
Campo di applicazione: corone temporanee, ponti temporanei (da 3 a 4 parti)

Composizione: Polvere polimerica a base di polimetacrilato, perossido di dibenzolo e pigmenti Liquidi: Metilmetacrilato, dimetacrilato, attivatore.

Controindicazioni: Non utilizzare in caso di allergia/persensibilità conosciute agli acrilati o a qualsiasi altro componente. La scheda di sicurezza è disponibile sulla pagina web.

Qualora si verificasse un grave incidente in relazione al dispositivo, esso deve essere segnalato al produttore (Polident d.o.o., vigilanca@polident.si) e alle autorità competenti dello Stato membro nel quale opera l'utilizzatore.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Non utilizzare Poltemp per la produzione diretta di corone e ponti. Controllare visivamente il liquido. Non utilizzare qualora si notasse la presenza di sedimenti o gel. Smaltirlo in conformità con la legislazione locale.
Prima dell'utilizzo, si consiglia di effettuare il condizionamento della temperatura dei componenti liquidi in e polvere alla temperatura ambiente.

Preparazione
Corona temporanea: Prima della preparazione, prendere un'impronta in silicone della dent e del paziente. Dopo la preparazione dei denti, prendere l'impronta finale e colare un modello in gesso utilizzando gesso di Classe III (Pol-dur). Qualora la preparazione della corona si estendesse sotto la gengiva, si consiglia di rifinire l'area sul modello per consentire al margine di protezione della corona temporanea. Colare un modello in gesso utilizzando gesso di Classe III (Pol-dur). Qualora la preparazione della corona si estendesse sotto la gengiva, si consiglia di rifinire l'area sul modello per consentire al margine di protezione della corona temporanea. Colare un modello in gesso utilizzando gesso di Classe III (Pol-dur) in un'impronta in silicone. Preparare un modello in gesso per realizzare un ponte temporaneo. Dopo aver preparato il modello, creare una ceratura e realizzare un indice in silicone. Rimuovere la cera e isolare il modello con un liquido isolante.

- MISCELAZIONE E POLIMERIZZAZIONE: Mescolare la polvere e il liquido con un rapporto di 2,5 g di polvere per 1 g di liquido. Aggiungere lentamente il liquido al contenitore di miscelazione contenente la polvere. Miscelare le polvere e il liquido con una spatola per circa 30 secondi. In seguito, coprire il recipiente di miscelazione e lasciare riposare il composto per circa 7 minuti a temperatura ambiente (22°C). Trascorso questo tempo, il materiale dovrà avere una consistenza adatta alla lavorazione. Il tempo di lavorazione a temperatura ambiente (22°C) è di circa 6 minuti. Rimiscelare il materiale e applicarlo con una spatola su una matrice o un indice in silicone. Posizionare l'indice/impronta con il materiale sul modello. Dopo aver applicato il materiale, attendere 2-3 minuti e modellarlo nella forma desiderata. Rimuovere il materiale in eccesso e inserire il modello con il materiale in una pettola a pressione. Le condizioni di polimerizzazione sono le seguenti: temperatura dell'acqua di 55-60°C, pressione di 6 bar e tempo di polimerizzazione di 10 minuti. Dopo aver completato la polimerizzazione, rifinire grossolanamente il prodotto ottenuto dai corali dentina e preparare l'area all'applicazione del colore incisale. Applicare il liquido Poltemp sullo strato di dentina e applicare il colore incisale con una spatola da modello, modellarla e polimerizzarla nuovamente.

- FINITURA: Dopo aver rimosso il gesso e il silicone, la corona o il ponte temporaneo viene lavorato e lucidato utilizzando le procedure standard di un laboratorio odontotecnico.

NOTA! Le ricostruzioni dentali in acrilico contengono sempre una piccola quantità di monomero residuo. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare un aumento del monomero residuo, scarse proprietà fisiche o la formazione di biofilm a causa di una qualità superiore inadeguata.

Informazioni da fornire al dentista:

In conformità con le pratiche standard della medicina dentale, il dentista deve pu- tire il dispositivo medico prima di inserirlo nella cavità orale. Il dentista deve fornire al paziente le istruzioni per un'adeguata pulizia del dispositivo medico e seguire il paziente con visite periodiche per valutare lo stato del dispositivo medico. Si consiglia di pulire il dispositivo medico con una spatola morbida e un dentifricio non abrasivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un aumento della formazione di biofilm o una decolorazione del materiale.

Conservazione: Conservare il liquido a temperatura fino a 25 °C e tenerlo al riparo dalla luce solare. Conservare la polvere a una temperatura fino a 30 °C, tenerla al riparo dalla luce solare e mantenerla asciutta.

Avvertenze generali per il tecnico dentista: Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza. La data di scadenza è stampata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini e conservare il liquido e la polvere esclusivamente nella confezione originale. Non utilizzare se l'imballaggio primario è danneggiato. Evitare il contatto diretto della pelle con il materiale non polimerizzato nonché l'iniezione dei vapori. È necessario lavarsi le mani dopo aver maneggiato il materiale non polimerizzato. Chiudere i contenitori immediatamente dopo l'uso. Assicurare un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. Durante le fasi di rifinitura (rifinitura, molatura, lucidatura) garantire un'adeguata aspirazione delle particelle dal luogo di lavoro. Incassare dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI) durante la manipolazione e l'incassatura. In assenza di misure di protezione dentale, durante la manipolazione di materiale non polimerizzato e le procedure di finitura possono verificarsi irritazioni agli occhi, alla pelle e agli organi respiratori. Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per i dispositivi di protezione individuale appropriati (disponibile sul sito <https://www.polident.si>). Non conservare la polvere a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di tempo.

Avvertenze per il componente liquido: Il liquido è altamente infiammabile. Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo (reazione allergica della pelle). Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. I flaconi devono essere ben chiusi e conservati in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Indossare guanti di protezione/indumenti protettivi/protezione per gli occhi. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciogliere la pelle con acqua o fare una doccia. Non versare nelle fognature. Adottare misure precauzionali contro le scarche elettrostatiche.

Smaltimento: Non versare il prodotto inutilizzato nei sistemi di drenaggio! Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire in conformità con le normative locali e/o nazionali.

Caratteristiche materiali	Specificazioni	Metodo
Sorbia	< 40 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Rozpuszczalność	< 7,5 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Wytrzymałość na zginanie	> 50 MPa	EN ISO 10477

Warianty: Galima įsigyti įvairių spalvų ir kiekių. Kreiptis į platintoją.
Indikacijos: Edentulizmas, dalinis edentulizmas
Taikymo sritys: laikinos karinės, laikini titeliai (nuo 3 iki 4 dalių)

Sudėtis: Miltelinis polimeto metakrilato pagrindu pagaminti milteliai, dibenzolo peroksidas ir pigmentai
Sistys: metilo metakrilatas, dimetakrilatas, aktyvatorius

Praciewiczazanie: Nie stosować u pacjentów z alergią czy nadwrażliwością na akrylany lub inne składniki preparatu. Dokładna karta charakterystyki jest sukceskimes laikinas protezas laikotarpui nuo pradinio ruošinio iki galutinio (ligaliko) protezo paruošimo. To tikslas – apsaugoti atitardęgą dentatę, neleisti dantis pasiskirti, užtikrinti estetinio rezultato, tinkamai formuoti dantėnu audinį ir išvengti žlugimo. Medžiaga tiekiamas kaip sistys ir milteliai ir ją visada reikia naudoti kartu su dantų priežiūros specialistu (dantų techniku).

Medžiagos sąvayė	Specifikacija	Metodas
Sorbiacija	< 40 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Tipumas	< 7,5 μ g / mm ²	EN ISO 10477
Lenkimo stipris	> 50 MPa	EN ISO 10477

Variantai: Galima įsigyti įvairių spalvų ir kiekių. Kreiptis į platintoją.
Indikacijos: Edentulizmas, dalinis edentulizmas
Taikymo sritys: laikinos karinės, laikini titeliai (nuo 3 iki 4 dalių)

Sudėtis: Miltelinis polimeto metakrilato pagrindu pagaminti milteliai, dibenzolo peroksidas ir pigmentai
Sistys: metilo metakrilatas, dimetakrilatas, aktyvatorius

Kontraindikacijos: Nenaudokite žinomos alergijos / hiperjautrumo akrliniais ir bent kuriam kitiem komponentui atveju. Saugos duomenų lapas yra pateiktas tinklalapyje.
Prisipastebėjimai: naudoti su priemonėmis, atveju apie jė reikia pranešti gamintojui (Polident d.o.o., vigilanca@polident.si) ir kompetetingai Sales narės, kur yra įsteigtas naudotojas, institucija.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Nenaudokite „Poltemp“ tiesioginiams karūnėli ir titeliui gamybai. Vizualiai patikrinkite sistę. Pastebėjus nurodėlių arba gėl, nenaudokite sistės. Išmeskite į laikymiesiems vietinėm teisėm atspaud. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

Laikinas titelis: silikoninėmis atspaudais išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Paruoškite gipsinį modelį laikinio titelio gamybai. Paruošite modelį, padarykite vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinkite vašką ir izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduojame apjuoti modelio plotą, kad būtų galima laisvai pasiekti ruošinio ribą. Jei nedaromas įrankinis atspaudas, reikia padaryti vaškinį modelį su silikoniniu atspaudu. Pašalinę vašką, izoliacinį skysčių izoliuokite gipsinį modelį.

- PAUŠIMAS: prieš darydami ruošinį, paimitke silikoninį paciento dantų atspaudą. Paruošę dantis, paimitke galutinį atspaudą ir išleiskite gipsinį modelį nauodami III klasės gipsą („Polidur“). Jį karūnėlės ruošinys yra žemiau dantėnu, rekomenduoj